



# 令和2年度

令和2年7月7日  
能登開発営農対策協議会  
石川県くり生産振興会

# くい防除情報

～果実病害虫防除が収量アップの決め手です～

イガに十分かかるよう散布しましょう！

## ☆ 第1回適期 7月27日(月) 前後

対象病害虫 モモノゴマダラノメイガ (幼虫から成虫発生初期)  
実炭疽病



	種類	濃度	散布量(10a)	使用時期	使用回数
殺虫剤	エルサン粉剤2	/	4～6kg	収穫14日前まで	4回以内 (粉剤・乳剤の 合計)
	または エルサン乳剤				
殺菌剤	ベンレート 水和剤	3,000倍	400ℓ	裂果前まで、但し 収穫14日前まで	4回以内

☆ベンレート水和剤はエルサン乳剤と混合してもよい。

## ☆ 第2回適期 8月4日(火) 前後

対象病害虫 モモノゴマダラノメイガ (成虫産卵最盛期)



○次の薬剤のうちいずれか1剤を散布する

	種類	濃度	散布量(10a)	使用時期	使用回数
殺虫剤	フェニックスフロアブル	4,000倍	300～ 400ℓ	収穫前日まで	2回以内
	エルサン乳剤	1,000倍		収穫14日前まで	4回以内 (粉剤・乳剤の 合計)
	エルサン粉剤2		4～6kg	収穫14日前まで	

◎モモノゴマダラノメイガの第3回防除とクリシギゾウムシの防除については、  
次回の防除情報(8月上旬頃)にてお知らせします

詳しくは、最寄の農林事務所、JAにご相談下さい。

農薬が他の作物等にかからないよう十分に注意して下さい。

▽農薬の使用にあたっては、ラベルの記載事項を遵守しましょう。  
▽防除は朝夕、風のない時に行いましょう。

