


赤土ばれいしょ 【品種】男爵

目標収量：2,000 kg/10a

月旬 作型	4			5			6			7			8			9	
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中
春作	○	○															
作業内容 (マルチ栽培)	植	芽			病		病	病		収							
	付	か			害		害	害									
	け	き			虫		虫	虫		穫							
					防		防	防									
					除		除	除									

1. 植栽基準（10a当り4,600株）

- うね幅 80cm
- 株間 27cm
- 覆土 10～15cm
- 黒マルチ 135cm幅



2. 施肥基準

肥料名		総量	基肥
BB444-50		70	70
有機肥		70	70
堆肥		2,000	2,000
成分量	チッソ	15.4	15.4
	リンサン	15.4	15.4
	カリ	15.4	15.4

(注) 苦土石灰や鶏糞堆肥の多量施用は高pH、そうか病の原因になるので注意する。

3. 病害虫防除指針

(平成26年12月3日時点)

対象病害虫	薬剤名	安全使用基準			備考
		希釈倍率等	収穫前日数	使用回数(以内)	
ケラ ネキリムシ類	ダイアジノン粒剤5	4~6kg/10a	植付前	1回	全面土壌混和又は 作条土壌混和
黒あざ病 黒あし病	アタッキン水和剤	40倍	植付前	合計 1回	5~10秒間種いも浸漬、 又は種いも100kg当り 2.5~3Lを散布
そうか病		40倍			種いも100kg当り 2.5~3Lを散布
		40~60倍			5~10秒間種いも浸漬
疫病	リドミルMZ水和剤	500~750倍	7日	3回	100~300L/10a
疫病	ダコニール1000	500~1,000倍	7日	合計 5回	100~300L/10a
夏疫病		1,000倍			

- ※ 農薬を使用する際は、必ずラベルを確認し使用基準を守って使用すること。
 ※ 散布後はタンク、ノズル内に農薬が残らないよう、しっかり洗浄すること。
 ※ 防除は、他の作物へ農薬が飛散しないよう注意して行うこと。